

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL (PBM) I.K.V. COVID-19: COHORT-AFDELING

BETREDEN VUILE ZONE, ZONDER BETREDEN PATIËNTENKAMERS
bv. apotheek, goederentransport

Medewerker:


- handhygiëne
- mondneusmasker: AZSTM masker of verzorgingsmasker

BETREDEN PATIËNTENKAMER

1. Medewerker:

STANDAARD

- handhygiëne
- gele isolatiejas of alternatief bij stockbreuk
- mondneusmasker type FFP2 of N95
- spatbril
- handschoenen



AËROSOLGENERERENDE HANDELINGEN

- bijkomend faceshield* voor de uitvoerende en assisterende zorgverstreker

2. Bezoeker:

- handhygiëne
- mondneusmasker type verzorgingsmasker
- geen fysiek contact
- eigen kledij thuis wassen op 60°

Cohort maatregel: schort en masker mag men blijven dragen voor verschillende kamers in de vuile zone, tenzij zichtbaar bevuild. Handschoenen worden na elke patiënt vervangen + handhygiëne.

Bronisolatie binnen de cohort: handschoenen, schort en masker vervangen bij het verlaten van de kamer.

PROPERE ZONE

Medewerker: mondneusmasker type verzorgingsmasker

BIJ BETREDEN EN VERLATEN AFDELING/ VUILE ZONE

Altijd handhygiëne toepassen

FFP2/N95 masker, schort en handschoenen worden niet gedragen in de propere zone

ALGEMENE OPMERKINGEN

Strikte toepassing van handhygiëne is essentieel om jezelf, patiënt en omgeving te beschermen!

- bij elke steriele of zuivere handeling: handschoenen verwijderen en handen ontsmetten
- handschoenen ontsmetten is verboden!

Het gebruik van PBM is aangepast o.w.v. schaarste:

- mondneusmaskers kunnen tot 8 uren worden gebruikt en worden tussentijds bewaard in een gepersonaliseerd nierbekken of papieren enveloppe
- muts is optioneel: eigen keuze gebruiker

Mondneusmasker bij reanimatie:

- BLS: geen FFP2/N95 masker nodig, je draagt je verzorgingsmasker
- ALS: FFP2/N95 maskers te dragen door het reanimatieteam, voorzien in de reanimatiekar

Wat zijn aërosolgenererende handelingen?

Intubatie - CPR (balloneren) - open tracheale aspiratie - NIV - endoscopie via neus of mond die een hevige hoestreflex kan opwekken - optiflow

***faceshields** worden voorzien voor zorgverstrekkers op cohortafdelingen, IZ, spoedgevallen, OK en recovery, endoscopie, pediatrie en verloskwartier