

## STAALAFNAME WONDVOCHT / ETTER

toepassing	<p>Staalafname van wonden voor microbiologische analyse moet geïndiceerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tekenen van infectie lokaal (etter, roodheid, pijn, zwelling, lymfangitis, ...) of slechte wondheling</li> <li>• al dan niet gepaard met systemische tekenen van infectie (koorts)</li> <li>• diabetische voet</li> </ul>
voorbereiding	<p>De meeste wonden zijn gecontamineerd of gekoloniseerd met bacteriën uit de omgeving, zelfs met anaeroben, die niet noodzakelijk verantwoordelijk zijn voor de wondinfectie. Daarom dienen voorafgaand aan de staalafname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ open wonden gereinigd (niet gedesinfecteerd) te worden.</li> <li>○ necrotische wonden gedebrideerd te worden</li> <li>○ intacte huid gedesinfecteerd te worden (voor punctie of biopsie)</li> </ul> <p><b>Werkwijze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig de wond zorgvuldig met steriel fysiologisch water.</li> <li>• Debridering: verwijder necrotisch weefsel en oppervlakkig exsudaat (decubituswonden mogen door competente verpleegkundigen gedebrideerd worden, andere dienen door een arts uitgevoerd te worden).</li> <li>• Spoel de wonde na met steriel fysiologisch water</li> <li>• In geval van intacte huid, zoals bij abces, cyste,... : desinfecteer de huid met 70% alcohol</li> </ul>

WISSER (E-SWAB)		
	toepassing	Open oppervlakkige wonden, cellulitis
	staalafname	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol, na voorbereidende reiniging, de wisser onder lichte druk over het gereinigde oppervlak, in zigzag, gedurende <math>\pm 30</math> sec. Wisser minimaal 1 cm<sup>2</sup>.</li> <li>• Raak de wondranden en de wondomgeving niet aan met de wisser, om bijbesmetting te voorkomen.</li> <li>• Bij chronische wonden dient de wisser aan de binnenzijde van de wondranden afgenomen te worden.</li> </ul>

PUNCTIE		
	toepassing	Diepe, etterende wonde, abces, cellulitis, cyste. Decubituswond, diabetische voetwonde, andere chronische wonde
	staalafname	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspireer, na voorbereidende reiniging, met steriele naald en spuit zoveel vocht als mogelijk uit de diepte van de wonde of abces of cyste.</li> <li>• Verwijder onmiddellijk de overtollige lucht uit de spuit, verwijder de naald en sluit de spuit af met een stopje (belangrijk voor cultuur van anaeroben).</li> </ul>

BIOPSIE		
	toepassing	Decubituswonde, diabetische voetwonde, andere chronische wonde
	staalafname	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem, na voorbereidende reiniging, een stukje weefsel met een steriel pincet vast, en knip dit los met schaar of bistouri.</li> <li>• <i>Kleine biopten:</i> Plaats het biopt op aseptische wijze in een tube met transportmedium (vb. tube van roze E-swab). Noteer duidelijk dat het over een biopt gaat, en steek geen wisser in de tube.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grote biopten:</i> Breng het biopt over in een steriel potje. Vul het potje met steriel fysiologisch water, tot het biopt onder staat, en niet kan uitdrogen.</li></ul>
--	--	--