




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **Gemzar®** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via infuus gegeven. Voor aanvang van de behandeling dient er dan ook een poortkatheter geplaatst te worden (zie brochure poortkatheter, volgt via vaatchirurgie).

Werkingsmechanisme

Gemzar® (Gemcitabine): celremmend middel



Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven volgens onderstaand schema. In de eerste cyclus wordt de chemotherapie één keer per week toegediend gedurende zeven weken. De achtste week is een rustweek.

De toediening gebeurt ambulant, je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten. Alvorens de chemotherapie toe te dienen zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosis-aanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag							
Gemcitabine	1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28
	x		x		x		x	
	29	30-35	36	37-42	43	44-49	50	51-56
	x		x		x		/	

De volgende cyclus duurt vier weken. De chemotherapie wordt één keer per week toegediend en dit gedurende de eerste drie weken. De vierde week is opnieuw een rustweek.

Naam product	Dag							
Gemcitabine	1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28
	x		x		x		/	

Vóór de chemotherapie wordt via de mond of infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. Zo nodig krijg je ook medicatie mee naar huis om misselijkheid te voorkomen of te behandelen.

Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na gemiddeld twee tot drie maanden gebeurt er een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Rillingen en/of koorts
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Verminderd aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Verminderd aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Verminderd aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Deze waarden worden elke keer dat je voor chemotherapie komt, gecontroleerd via een bloedname.

Minder frequente nevenwerkingen

- Allergische huiduitslag
- Vochtophoping
- Haarverdunning, zelden haarverlies
- Kortademigheid
- Leverfunctiestoornissen

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90