




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **Gemcitabine - Cisplatinum** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via infuus gegeven. Voor aanvang van de behandeling dient er dan ook een poortkatheter geplaatst te worden (zie brochure poortkatheter, volgt via vaatchirurgie).

Werkingsmechanisme

Gemcitabine: celremmend middel

Cisplatine: celremmend middel



Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen, De chemotherapie wordt één keer per week toegediend, gedurende de eerste twee weken. De derde week is een rustweek.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag			
	1	2-7	8	9-21
Gemcitabine	x		x	RUST
Cisplatine	x		x	RUST

De toediening gebeurt ambulantly, je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.

Alvorens de chemotherapie toe te dienen zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Vóór de chemotherapie wordt via de mond of infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. Zo nodig krijg je ook medicatie mee naar huis om misselijkheid te voorkomen of te behandelen.

Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na gemiddeld twee tot drie maanden gebeurt er een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen
- Rillingen en/of koorts
- Waarschuwing: nefrotoxiciteit (NSAIDs vermijden)
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Verminderd aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Verminderd aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Verminderd aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Deze waarden worden elke keer dat je voor chemotherapie komt, gecontroleerd via een bloedname.

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (bv. aften)
- Smaak- en reukveranderingen
- Diarree
- Haarverdunning, zelden haarverlies
- Huidveranderingen
- Vochtophoping voornamelijk t.h.v. de enkels
- Hoofdpijn en/of duizeligheid
- Kortademigheid
- Leverfunctiestoornissen

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Tussen 8.30 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90