




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **Modified - TOF** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



### Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via infuus gegeven. Voor aanvang van de behandeling dient er dan ook een poortkatheter geplaatst te worden (zie brochure poortkatheter, volgt via vaatchirurgie).

#### Werkingsmechanisme

Docetaxel (Taxotere®): cytostaticum (celremmend geneesmiddel)

Oxaliplatine (Eloxatin®): cytostaticum (celremmend geneesmiddel)

5-fluorouracil, 5FU: cytostaticum (celremmend geneesmiddel)

Folinezuur: géén cytostaticum, versterkt de werking van 5FU

Pelgastrim (Neulasta®): géén cytostaticum, stimuleert de aanmaak van witte bloedcellen



### Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren), één kuur duurt twee weken. Op dag één wordt docetaxel en oxaliplatine via infuus toegediend op het dagziekenhuis. Nadien wordt er vanaf dag één ook 5-fluorouracil in een pomp gegeven die gedurende 24 uur (thuis) continu loopt via de poortkatheter. Deze pomp wordt afgekoppeld na 24 uur (de tweede dag). Dit kan op het dagziekenhuis of thuis door een thuisverpleegkundige. Nadien volgen 11 dagen rust, vooraleer een nieuwe kuur start.

In overleg met je arts kan het zijn dat je op de vierde dag na de start van je therapie thuis (of in het ziekenhuis) groeifactor toegediend krijgt. Deze groeifactor Pelgastrim (Neulasta®) stimuleert maximaal de groei van witte bloedcellen. Deze toediening gebeurt onderhuids.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

| Naam product           | Dag |   |   |      |
|------------------------|-----|---|---|------|
|                        | 1   | 2 | 3 | 4-14 |
| Docetaxel              | x   |   |   | rust |
| Oxaliplatine           | x   |   |   | rust |
| Folinezuur             | x   |   |   | rust |
| 5FU                    | x   | x |   | rust |
| Pelgastrim (Neulasta®) |     |   | x | rust |

Alvorens de chemotherapie toe te dienen zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Vóór toediening van de chemotherapie wordt via de mond of infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. Je krijgt ook medicatie mee naar huis om misselijkheid te voorkomen of te behandelen.

### Premedicatie

De avond voor je chemo moet je rond 20 uur Dexamethasone (8mg) innemen. Je arts zal je meer info geven over de premedicatie.

### Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na gemiddeld twee tot drie maanden gebeurt er een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



## Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Vermoeidheid
  - Misselijkheid en braken
  - Vochtophoping (bv. gezwollen voeten)
  - Haaruitval
  - Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
    - Verminderd aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
    - Verminderd aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
    - Verminderd aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...
- Deze waarden worden elke keer dat je voor chemotherapie komt, gecontroleerd via een bloedname.
- Voosheid of tintelingen in handen en voeten (vooral neveneffect van oxaliplatine) - een gevoel dat versterkt wordt bij koude.
    - In de eerste dagen na de chemotherapie adviseren we dan ook om koude te vermijden
      - Vermijd om lang buiten te blijven als het koud is
      - Draag handschoenen om je handen te beschermen
      - Vermijd koude lucht (bv. airco, koelkast of diepvriezer, ...)
      - Was je handen met warm water
      - Eet geen koude voeding (bv. ijs) en drink geen koude dranken.

## Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (bv. Aften).
- Diarree
- Huid- en nagelveranderingen
- Tranende ogen
- Toesnoerend gevoel in de keel
- Koorts
- Allergische reactie

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

## Contactgegevens

### OPST

Tussen 8.30 en 16 uur  
tel. 015 89 21 21  
opst.azsintmaarten@emmaus.be

### Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur  
tel. 015 89 23 50

### Arts

Voor vragen aan je arts?  
Neem contact op met het medisch  
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90