



In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **Trifluridine - tipiracil** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via de mond gegeven in de vorm van tabletten. Je neemt de tabletten 's morgens en 's avonds, bij of ten laatste 1 uur na de maaltijd.

Werkingsmechanisme

Trifluridine-tipiracil (Lonsurf®) bestaat uit 2 stoffen:

- Trifluridine: celremmend geneesmiddel (cytostaticum)
- Tipiracil: middel dat zorgt voor een langere werking van Trifluridine

Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren), één kuur duurt vier weken. Op dag één kom je naar het dagziekenhuis voor een klinisch onderzoek, een bloedname en een voorraad pillen. Deze neem je thuis de eerste twee weken in gedurende vijf opeenvolgende dagen, gevolgd door twee dagen rust. Nadien volgen twee rustweken, alvorens de volgende cyclus te starten. De dosis per tablet bedraagt 15 of 20 mg en de totale dosis wordt bepaald door jouw arts

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag					
Trifluridine - tipiracil	Week 1		Week 2		Week 3	Week 4
	Dag 1-5	Dag 6-7	Dag 1-5	Dag 6-7		
... mg 's morgens	x	rust	x	rust	rust	rust
... mg 's avonds	x	rust	x	rust	rust	rust

Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na gemiddeld twee tot drie maanden gebeurt er een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Vermoeidheid
 - Misselijkheid en braken
 - Diarree
 - Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Vermindert aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Vermindert aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Vermindert aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...
- Deze waarden worden elke keer dat je voor chemotherapie komt, gecontroleerd via een bloedname.

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (bv. aften)
- Haarverdunning
- Koorts

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Tussen 8.30 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azzintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90