




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **nal-irinotecan en 5-fluorouracil (5FU)** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

Gedurende deze behandeling werken we met twee celremmende geneesmiddelen, nanoliposomaal irinotecan en 5-fluorouracil (5FU).



Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren). Eén cyclus duurt twee weken (veertien dagen) en houdt ook één dagopname voor chemotherapie in. Een nieuwe cyclus start altijd op dag één. Een volgende cyclus start twee weken later (na dag 1) en dit enkel indien je algemene toestand en bloeduitslagen dit toelagen.

De behandeling gaat door in het dagziekenhuis, een opname in het ziekenhuis is dus niet nodig.

Op de eerste dag van een nieuwe cyclus (dag één) kom je naar het ziekenhuis. Hier krijg je nanoliposomaal irinotecan en leucovorin toegediend. Nadien geven we, met behulp van een infuus-pompje, 5FU. Met dit pompje ben je in staat naar huis te gaan. Het is op de derde dag van de cyclus dat dit pompje wordt afgeschakeld, dit kan door een thuisverpleegkundige of in het ziekenhuis.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag				
	1	2	3	4	5 - 14
Nanoliposomaal Irinotecan	x				
Leucovorin	x				
5FU	x	x			

Aantal

Het aantal behandelingskuren zal jouw arts met jou bespreken. Na, gemiddeld twee tot drie maanden, gebeurt een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Vermoeidheid
- Diarree
- Haaruitval 25% - uitdunning frequent
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Verminderd aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Verminderd aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Verminderd aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Deze waarden worden elke keer dat je voor chemotherapie komt, gecontroleerd via een bloedname.

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (bv. aften, vooral t.g.v. 5FU)
- Misselijkheid en braken
- Constipatie
- Huidveranderingen
- Tranende ogen

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Tussen 8.30 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90