




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **SOX of Teysuno®** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende toedieningswijze, frequentie en mogelijke neveneffecten.



Toedieningswijze

De therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen, namelijk Teysuno® (doelgerichte therapie) en oxaliplatine (cytostaticum).



Frequentie

De therapie wordt gegeven in cycli. Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen).

Tijdens één cyclus wordt oxaliplatine (Eloxatin®) op dag 1 toegediend en neem je Teysuno® dagelijks in gedurende 14 dagen, gevolgd door één week rust. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als je bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Teysuno® bestaat in capsules van 15 en 20 mg. Je arts vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, kan de dosis aangepast worden.

Naam product	Dag		Wijze van toediening
Oxaliplatinum	Dag 1		intraveneus (via katheter)
Teysuno	Dag 1 - Dag 15	Dag 16 - Dag 21: rust	Teysuno® wordt twee keer per dag ingenomen met 12 uur tussen beide innames. Teysuno® wordt op een lege maag ingenomen. Dit betekent 1 uur vóór of 1 uur na de maaltijd
... mg 's ochtends ... mg 's avonds	Dag 1 - Dag 15	Dag 16 - Dag 21: rust	

Het aantal kuren behandeling zal je arts met je bespreken. Na gemiddeld drie maanden gebeurt er een herevaluatie door middel van een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.

Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

1. Oxaliplatinum:



- Vermoeidheid
 - Misselijkheid en braken
 - Diarree
 - Leverfunctiestoornissen
 - Zenuwprikkeling vingertoppen en voeten bij koude
 - Spierverkramping in de keel, kaak of ledematen, deze klachten worden vooral uitgelokt of verergerd door koude
-
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Verminderd aantal witte bloedcellen waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Verminderd aantal rode bloedcellen waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Verminderd aantal bloedplaatjes waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...
- Deze waarden worden elke keer je komt voor chemotherapie gecontroleerd via een bloedname.

2. Teysuno:

- Droge, tranende ogen
- Duizeligheid en hoofdpijn
- Misselijkheid, diarree of buikkrampen
- Vermoeidheid
- Beenmergonderdrukking

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90