



In samenspraak met je arts werd besloten om een therapie met Fruquintinib (Fruzaqla) te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via de mond gegeven in de vorm van tabletten. Je neemt de tabletten bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip met wat water (met of zonder voeding).

Werkingsmechanisme

Fruquintinib (Fruzaqla): tyrosine kinase inhibitor gericht op vasculaire endotheel groeifactoren (VEGF). Het remt de tumorgroei door alle drie de VEGF-receptoren selectief te inhiberen.

Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren), één kuur duurt vier weken. Op dag één kom je naar het dagziekenhuis voor een klinisch onderzoek, een bloedname, urinestaal en een voorraad pillen. Je neemt dagelijks een dosis in gedurende drie weken, gevolgd door 1 week rust. Fruquintinib (Fruzaqla) bestaat in tabletten van 5mg of 1mg. De arts bepaalt welke dosis je dagelijks moet innemen. Na vier weken start de volgende cyclus.

Samenstelling van de therapie

Naam product	Dag	
	Week 1, 2 en 3	Week 4
Fruquintinib	x	Rust

Alvorens de chemotherapie toe te dienen zal er telkens een bloedafname en urine-analyse gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na, gemiddeld twee tot drie maanden, gebeurt een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Verhoogde bloeddruk
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust en veranderde smaak/geur
- Diarree
- Huidveranderingen aan de handen en voeten

Minder frequente nevenwerkingen

- Verlaagd aantal bloedplaatjes
- Gewrichtsklachten
- Eiwitverlies in de urine
- Beperkte verhoogde bloedingsneiging

Let op: Fruquintinib kan interageren met bepaald voedsel. Vermijd het eten/drinken van pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid.

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90