



Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs

Sigmoidoscopie

Wat is een sigmoidoscopie?

Bij een sigmoidoscopie brengen we een soepele buis met aan het uiteinde een camera (de endoscoop) via de anus in. We onderzoeken zo de binnenzijde van de endeldarm en het hierboven gelegen deel (het sigmoid) van de dikke darm. Soms nemen we kleine stukjes weefsel (biopsies) af voor microscopisch onderzoek.

Vorbereiding

- Je moet zelf niets doen ter voorbereiding van het onderzoek.
- In de meeste gevallen wordt ter plaatse, op de afdeling endoscopie, kort voor het onderzoek een lavement (soms twee) gegeven om het laatste deel van de darm te legen. Om die reden moet je 30 minuten voor de afspraak aanwezig zijn.
- Breng voor het onderzoek de arts op de hoogte van: medicatie die je inneemt (zeker bloedverdünnende medicatie), allergieën voor medicaties, hart- of ademhalingsproblemen, (vermoeden van) zwangerschap, aanwezigheid pacemaker of defibrillator.

Het onderzoek

- Tijdens het onderzoek lig je op de linkerzij.
- Er wordt doorgaans geen verdoving gegeven.
- Er wordt gel ter hoogte van de anus aangebracht.
- De endoscoop wordt langs de anus ingebracht en voorzichtig opgevoerd. Dit kan krampen veroorzaken bij passage van bochten in de darm. Er wordt ingevoerd tot er te veel stoelgang aanwezig is of tot het te oncomfortabel voor jou wordt.
- Tijdens het onderzoek blazen we lucht in; je mag gerust windjes laten.
- Het volledige onderzoek word je door een verpleegkundige begeleid.
- Het onderzoek duurt doorgaans vijf - tien minuten.
- Soms worden kleine letsels verwijderd of weggebrand, bijvoorbeeld kleine poliepen of afwijkende bloedvatjes. Dit wordt ter plaatse met jou besproken.

Na het onderzoek


- Na het onderzoek kan het zijn dat je nog een keer naar het toilet moet gaan.
- De arts deelt je de bevindingen mee.
- Nadien mag je naar huis; soms heb je tijdelijk een opgeblazen gevoel.
- Soms nemen we biopsies (kleine weefselstukjes) van het slijmvlies voor microscopisch onderzoek om bijvoorbeeld te controleren op een ontsteking of om een letsel te typeren.
- Het duurt doorgaans één week tot het resultaat gekend is, dit sturen we door naar de verwijzende arts en je huisarts. Je neemt contact op met de verwijzende arts of je huisarts om het resultaat te bespreken.

Risico's en complicaties

- Elke medische handeling draagt een risico met zich mee.
- De complicaties van een diagnostische sigmoidoscopie zijn uitzonderlijk (kleine kans op bijvoorbeeld bloeding of perforatie).
- We reinigen en desinfecteren de endoscopen na ieder onderzoek volgens de geldende normen om de overdracht van infecties te voorkomen.

Contact

Voor meer info of vragen tel. 015 89 10 10



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten.

In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

vzw Emmaüs - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

NB109 26-07-2023