



In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met carboplatinum (Carboplatin®) - etoposide (Veposid®) te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten



Toedieningswijze

De therapie wordt volledig via infuus gegeven. Voor aanvang van de behandeling dient er dan ook een poortkatheter geplaatst te worden.

Werkingsmechanisme

Carboplatinum: cytostaticum (celremmend geneesmiddel)

Etoposide: cytostaticum (celremmend geneesmiddel)

Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren). Eén kuur duurt 3 weken, waarbij er chemotherapie wordt gegeven op dag 1, 2 en 3.

Dit gebeurt ambulant, je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.

In zeldzame gevallen wordt de patiënt toch tijdelijk gehospitaliseerd.

Op dag 1 wordt carboplatinum (Carboplatin) en etoposide (Veposid) toegediend en op dag 2 en 3 etoposide (Veposid). Cfr. schema hieronder.

Product	Dag				Wijze van toediening
	1	2	3	4-21	
Carboplatinum	x				Infuus over 1uur
Etoposide	x	x	x		Infuus over 1u

Alvorens te starten zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Je krijgt na de toediening nog ondersteunende medicatie mee naar huis.

In overleg met je arts kan het zijn dat je op de vierde dag na de start van je therapie thuis groeifactor toegevoegd krijgt. De groeifactor (Lonquex®) gaat maximaal je witte bloedcellen stimuleren. Deze toediening gebeurt onderhuids.

Het aantal kuren behandeling zal je arts met je bespreken.

Na gemiddeld 3 maanden gebeurt er een herevaluatie door middel van een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (soms aftjes)
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg

=> Verminderd aantal **witte bloedcellen** waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.

=> Verminderd aantal **rode bloedcellen** waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.

=> Verminderd aantal **bloedplaatjes** waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Deze waarden worden elke keer je komt voor chemotherapie gecontroleerd via een bloedname.

Minder frequente nevenwerkingen van de therapie

- Haarverdunning/verlies
- Diarree
- Oorsuizingen
- Tintelingen/voos gevoel in de vingertoppen en/of tenen

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azzintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90