



In samenspraak met je arts werd er besloten om een lange reeks chemoradiotherapie te starten i.k.v. rectumkanker (endeldarmkanker). Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten



Toedieningswijze

De chemotherapie wordt via infuus gegeven. Voor de start van de therapie zal een poortkatheter geplaatst worden.

Nota bene: soms wordt geopteerd om 5-FU in pilvorm i.p.v. infuus te geven (pilvorm is capecitabine, zie aparte brochure).

Werkingsmechanisme

5-fluorouracil of 5-FU: cytostaticum (celremmend geneesmiddel). Door de toevoeging van 5-FU zal de bestraling effectiever zijn.

Praktisch verloop van de therapie

Een lange reeks chemoradiotherapie omvat 25 sessies radiotherapie, verspreid over 25 weekdays en dus over 5 weken. Tijdens heel deze periode zal chemotherapie toegediend worden.

Tijdens elke week zal je één maal naar het dagziekenhuis komen voor chemotherapie (dag 1). De chemotherapie wordt toegediend via een pompje dat je meeneemt naar huis en 7 dagen lang werkt. Eén week later kom je terug voor een nieuw pompje.

De toediening van chemotherapie / aanhangen van het pompje gebeurt ambulant. Je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.

Alvorens de chemotherapie toe te dienen zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk.

Nota bene: in geval capecitabine zal je de pillen innemen op alle dagen van bestraling (dus normaal gezien alle weekdays maar niet in het weekend).

Naam product	Dag							Wijze van toediening
	1	2	3	4	5	6	7	
5-FU	x	>	>	>	>	>	>	Pompje
Bestraling	x	x	x	x	x			



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Huidveranderingen aan handen en voeten
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg

=> Verminderd aantal **witte bloedcellen** waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.

=> Verminderd aantal **rode bloedcellen** waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.

=> Verminderd aantal **bloedplaatjes** waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Minder frequente nevenwerkingen van de therapie

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies (soms aftjes)
- Haarverdunning (géén haaruitval)

Nota bene: de meest voorkomende nevenwerkingen van radiotherapie t.h.v. de endeldarm zijn huidverbranding en diarree. Je radiotherapeut zal dit uitgebreider met je bespreken.

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azzintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90